



МРТ печени с Примовистом

Подготовка: Проводится натощак или через 6 часов после последнего приема пищи. За 2 дня до исследования необходимо соблюдать **бесшлаковую диету***. Можно принимать лекарства с небольшим количеством воды.

ВАЖНО!
Противопоказания для проведения МРТ:

Абсолютные противопоказания МРТ:	Относительные противопоказания к МРТ:
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые импланты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозировки медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	<ul style="list-style-type: none">стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев;брекеты.женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования МРТ, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований МРТ (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

МРТ с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) Для качественного проведения исследования просим Вас соблюдать рекомендации врача и правильно подготовиться к назначенному Вам исследованию.



МР-холангиопанкреатография

Подготовка: Проводится натощак или через **6 часов** после последнего приёма пищи, за 3 часа до исследования не пить. За 2 дня до исследования необходимо **соблюдать бесшлаковую диету***.

Можно пить воду в небольшом количестве и принимать лекарства. В течении 2-3 дней перед исследованием необходимо принимать «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день)

За 2-3 часа до исследования принять спазмолитическое средство (3 таблетки «Но-шпа» 40 мг либо 2 таблетки «Дюспаталина» или «Бускопана» в случае непереносимости «Но-шпы»).

ВАЖНО! Противопоказания для проведения МРТ:

Абсолютные противопоказания МРТ:	Относительные противопоказания к МРТ:
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые импланты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозировки медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	<ul style="list-style-type: none">стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев;брекеты.женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования МРТ, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований МРТ (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

МРТ с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания.



МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Подготовка: Проводится натощак или через **6 часов** после последнего приёма пищи, за 3 часа до исследования не пить. За 2 дня до исследования необходимо **соблюдать бесшлаковую диету***.

Можно пить воду в небольшом количестве и принимать лекарства. В течении 2-3 дней перед исследованием необходимо принимать «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день)

За 2-3 часа до исследования принять спазмолитическое средство (3 таблетки «Но-шпа» 40 мг либо 2 таблетки «Дюспаталина» или «Бускопана» в случае непереносимости «Но-шпы»).

ВАЖНО!

Противопоказания для проведения МРТ:

Абсолютные противопоказания МРТ:	Относительные противопоказания к МРТ:
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые импланты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозировки медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	<ul style="list-style-type: none">стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев;брекеты.женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования МРТ, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований МРТ (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

МРТ с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания

MРТ органов малого таза

Проводится **через 2 часа** после последнего приема пищи. За 2 дня до исследования соблюдать **бесшлаковую диету***. Можно принимать лекарства с небольшим количеством воды.

В течении 2-3 дней перед исследованием необходимо принимать «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день)

В день исследования желательно опорожнить кишечник естественным способом, при задержке стула использовать очистительную микроклизму (например, «МИКРОЛАКС»).

За 2-3 часа до исследования принять спазмолитическое средство (3 таблетки «Но-шпа» 40 мг либо 2 таблетки «Дюспаталина» или «Бускопана» в случае непереносимости «Но-шпы»).

За час до МРТ рекомендуется выпить 400–500 мл обычной воды и воздержаться от посещения туалета.

ВАЖНО!

Противопоказания для проведения МРТ:

Абсолютные противопоказания МРТ:	Относительные противопоказания к МРТ:
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые имплантанты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозировки медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	<ul style="list-style-type: none">стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев;брекеты.женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования МРТ, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований МРТ (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

MРТ с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА ко всем видам МРТ таза:

1. МРТ органов малого таза (гинекология):

Исследование планируется на 6-12 день цикла. При менопаузе/постменопаузе в любой день.

2. МРТ предстательной железы:

Если выполнялась биопсия простаты, то рекомендуется проводить МРТ не ранее, чем через 1 месяц после нее, если лечащим врачом не назначено иначе.

3. МРТ прямой кишки:

Очистить кишечник накануне вечером или в день исследования естественным путем.

4. МРТ мочевого пузыря:

Необходимо заполнить мочевой пузырь, исследование проводится при умеренных позывах на мочеиспускание (не мочиться за 1-2 часа до исследования – определяется индивидуально самим пациентом).

ВАЖНО!

Противопоказания для проведения МРТ:

Абсолютные противопоказания МРТ:	Относительные противопоказания к МРТ:
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые имплантаты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозирования медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	• стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев; • брекеты. • женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования МРТ, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований МРТ (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

МРТ с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания

MPT молочных желез

(!) Исследование всегда выполняется с внутривенным контрастированием.

Проводится **через 2 часа** после последнего приема пищи. Для пациентов **женщин** выполняется в первую фазу цикла (чаще всего это 6-12 дни цикла, считаются от 1 дня менструации), если врачом не назначено иначе.

Если MPT молочных желез выполняется для оценки состояния грудных имплантов, то день проведения не зависит от цикла.

Для пациентов **мужчин** предварительная подготовка к данному исследованию не требуется.

ВАЖНО!

Противопоказания для проведения MPT:

<u>Абсолютные противопоказания MPT:</u>	<u>Относительные противопоказания к MPT:</u>
1. наличие кардиостимулятора; 2. наличие металлических конструкций из ферромагнетиков (магнитных металлов); 3. слуховые импланты; 4. инсулиновые насосы (помпы); 5. устройства дозировки медицинских препаратов; 6. осколки или пули в мягких тканях; 7. металлические постоперационные клипсы на сосудах из неуточненных материалов.	<ul style="list-style-type: none">стенты коронарных артерий, установленные менее 6 месяцев;брекеты.женщины, находящиеся в первом триместре беременности.

На все металлические элементы в теле пациента необходимо предоставить медицинские документы!!!

Просим Вас приходить за 15-20 минут до исследования MPT, а также приносить с собой результаты предыдущих исследований MPT (диски, данные осмотра врача и проведенного лечения).

Желательна комфортная форма одежды с широкими рукавами (для удобства установки катетера – при необходимости), без металлических украшений и компонентов на ткани.

MPT с контрастом

Очень важно сообщить врачу, если у вас когда-либо были аллергические реакции, особенно на препараты, вводимые внутривенно.

Несмотря на то, что современные контрастные вещества считаются безопасными, в редких случаях возможны побочные реакции.

Обязательно нужно сообщить врачу о наличии заболеваний почек!!! Контрастное вещество выводится через почки, и при наличии хронической почечной недостаточности его использование может быть ограничено или запрещено. Врач может попросить заранее сдать анализ крови на креатинин, мочевину и другие показатели почечной функции.

Пациентам с онкологическими заболеваниями и с заболеваниями почек ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! иметь при себе результат анализа крови на креатинин (срок годности анализа 14 дней).

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания

БЕСШЛАКОВАЯ ДИЕТА

Разрешено	Запрещено
<p>Вся белковая пища:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отварное мясо или птица • Нежирные сорта рыбы • Нежирные кисломолочные продукты без пищевых добавок и красителей • Яйца • Желе, сахар, мед <p>Жидкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прозрачные бульоны • Чай и кофе без молока • Безалкогольные неокрашенные напитки • Вода 	<p>Вся растительная, квашеная и соленая пища:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Овощи • Фрукты • Ягоды • Шоколад • Зелень • Крупы • Орехи • Каши • Бобовые • Черный хлеб <p>Жидкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Молоко • Окрашенные напитки • Газированные напитки • Алкоголь

(!) При несоблюдении подготовки к исследованию – диагностика будет отменена. Запись на следующую дату исследования будет предложена согласно загруженности расписания